


西高津くさはな保育園

# 一時保育「つくし組」



社会福祉法人 寿会

西高津くさはな保育園 一時保育「つくし組」

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口 6-10-2

一時保育専用電話

TEL 044-543-9393 (平日 8:30~17:00)

## 一時保育「つくし組」

- 対象年齢 : 生後4か月から就学前
- 1日定員 : 12名
- 保育時間 : 月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始12/29～1/3は除く）  
8:30～17:00 の間で必要な時間

### 【利用形態について】

#### ○ 非定型的保育

保護者の就労や就学等の事由により、週2日又は3日、家庭で保育が出来ないお子さんを保護者に代わって保育するものです。

#### ○ 緊急・一時保育

保護者の急病や冠婚葬祭等の事由により、1日から14日間まで、家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって保育するものです。

また、週1日程度の就労や就学、育児等による心理的・肉体的負担の解消などでの利用も可能です。

### 【1日あたりの利用料金について】

利用形態に関わらず

- ・ 3歳以上児 : 1500円
- ・ 3歳未満児 : 2500円
- ・ 1歳未満児 : 2900円

※ 利用料金は当該年度4月1日時点の年齢によります。

但し、1歳未満児料金については、現に利用する日に満1歳未満である場合に適用となります。

※ 市内在住者に限り、市民税非課税世帯・被保護世帯・ひとり親（児童扶養手当受給）世帯・3人以上の一時保育一時保育同時利用時の第3子目以降は、利用料が免除となります（実費相当分除く）

### 【持ち物】

- ・ 着替え 2～3組
- ・ オムツ 6枚程、おしりふき
- ・ 大きめのビニール袋 2枚（汚れ物、オムツ持ち帰り用）
- ・ お昼寝用バスタオル 2枚
- ・ コップ
- ・ エプロン 2枚（0～2歳児）

※ 必要に応じてミルク、哺乳瓶、お弁当、おやつ

## 【食事について】

- ・ 給食提供となります。 1日500円（昼食、おやつ）
- ※ 離乳食の方、食物アレルギーのある方は、お弁当、おやつをご持参ください。  
ミルク利用の方は、飲む回数分のミルク。哺乳瓶をご持参ください。
- ※ 食物アレルギーのある方は検査結果のコピーをご提出ください。

## 【利用の流れについて】

### ① 登録

- ・ 毎月1日10:00～16:00に記入した申請書を提出してください。  
当該日が土日祝日の場合は平日になります。

### ② 予約

- ・ 非定型的保育希望の方は、こちらから利用の可否をご連絡致します。
- ・ 緊急・一時保育希望の方は、毎月20日以降10:00～16:00に翌月の予約希望を電話でお受け致します。該当日が土日祝日の場合は翌平日からとなります。  
担当者が調整したのち、後日こちらから利用の可否をご連絡致します。
- ・ 初回利用の前に面接をさせていただきます。その際に親子写真を撮らせて頂きます。

### ○ キャンセル

- ・ キャンセルの場合は前日15:00までにご連絡ください。当日のキャンセルは料金が発生しますので、ご了承ください。

## 【その他】

- ・ 川崎市医師会保育園医部会の指導により、原則として薬はお預かりできません。  
※虫除けシール等も、誤飲の可能性があるので遠慮ください。
- ・ 駐車場の利用はできません。
- ※ 登録は年度ごとになります。

## 地図

田園都市線「高津駅」より  
徒歩15分



## 【感染症の登園基準】

感染症により登園についての基準が定められています。ご理解とご協力をお願いいたします。

### ■医師が記入した登園許可証明書-①が必要な感染症

病名	潜伏期間	症状	登園の目安
麻疹（はしか）	約10日	咳、鼻水、目の充血、目やになど。いったん熱が下がった後再び高熱が出て全身に発疹出現し、ほおの内側に白く斑点ができる。	解熱後3日を経過してから
風疹（三日ばしか）	2～3週間	咳、鼻水、熱（微熱や高熱）などの風邪症状と全身に小さく赤い発疹が同時にでる。約3日で治る。	発疹が消失してから
水痘・带状疱疹（みずぼうそう・水痘・带状疱疹ウイルス）	2～3週間	発熱、痒み、丘疹、水泡、神経痛、刺激感、掻痒感	全ての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ・ムンプスウイルス）	2～3週間	耳下腺の腫れと痛み。片方だけの場合もある。腫れは1週間、熱は3～4日で引く。	耳下腺、顎下腺、舌下腺の症状が出現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
百日咳	1～2週間	風邪症状から始まり咳がひどくなりヒューと笛のような音を立てて息を吸い込む。熱はない。	咳が消失するまで、又は5日間の抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
インフルエンザ	1～3日	発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、鼻水、咳、全身倦怠感、食欲低下	発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
急性出血性結膜炎（アポロ病・エンテロウイルス）	1～3日	涙、目やに、充血、まぶたの腫れ、異物感	主な症状（目の充血や異物感）が消え2日経過してから
流行性角結膜炎（はやり目・アデノウイルス8、19、37型）	数時間～7日	目の充血、目やに、涙、眼瞼の腫れ、耳前リンパ節の腫脹と圧痛。4日目頃から角膜に点状の混濁がみられる。	結膜炎の症状が消失してから
咽頭結膜熱（プール熱・アデノウイルス3、4、7、11型）	3～7日	高熱、結膜炎、咽頭痛、頭痛、吐気、腹痛、下痢	主な症状が消え2日経過してから
溶連菌感染症	1～7日	発熱、咽頭痛、しばしば嘔吐を伴う。舌は莓のようにブツブツ赤くなる。掻痒感あり。	抗菌薬内服後24～48時間経過していること

※園にもございます。病院の用紙でも可能です

### ■医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症

病名	潜伏期間	症状	登園の目安
手足口病（エンテロウイルス71、コクサッキーウイルスA16、A6、A10）	2～6日	手足の発疹、口内疹。発熱は軽度。口内炎が酷くて食事がとれないことがある。	発熱や口腔内の水泡、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。
伝染性紅斑（りんご病）	1～2週間	軽い風症状の後、頬と四肢にレース状、地図状の紅斑	全身状態が良いこと
突発性発疹	7～14日	突然高熱が出る。時に下痢、嘔吐、リンパ節の腫れ。解熱後発疹が出て2～3日で消える。	解熱後1日以上経過し全身状態が良いこと
ヘルパンギーナ	2～6日	高熱、口のまわりのヘルペス様水泡。印疼痛が酷く食事や飲水ができないことがある。	発熱や口腔内の水泡、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。
マイコプラズマ肺炎	14～21日	風症状がゆっくりと進行し、咳が激しくなり3～4週間続く。	発熱や激しい咳が治まっていること
ウイルス性胃腸炎（ノロ、ロタ、アデノウイルス）	1～3日	嘔吐、クリーム色、白色の下痢	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること。
RSウイルス感染症	2～8日	風邪症状と同じ。気管支炎から肺炎を起こすこともある。	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと。
腸管出血性大腸菌感染症（O-157など）	4～8日	腹痛、下痢、血便	症状が始まりかつ抗菌薬による治療が終了し48時間をあけて、連続2回の検便でいずれも陰性が確認されてから。
結核	一様ではない	初期は微熱、咳、痰など。症状が進むと血痰	排菌がなく、感染の恐れがなくなってから

※園にごございます。登園時にご記入ください。